





Zwierzęta gospodarskie w 2025 r.

Livestock in 2025



Zwierzęta gospodarskie w 2025 r.

Livestock in 2025

Główny Urząd Statystyczny Statistics Poland

Warszawa Warsaw 2026

Opracowanie merytoryczne

Content-related works

Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa i Środowiska
Statistics Poland, Agriculture and Environment Department

Zespół autorski

Editorial team

Tomasz Milewski, Jolanta Przypaśniak, Robert Wieczorkowski, Anna Poreda, Alicja Kowalczyk,
Anna Tylkowska-Siek

Kierujący

Supervisor

Tomasz Milewski

Prace redakcyjne

Editorial work

Anna Poreda

Skład i opracowanie graficzne

Typesetting and graphics

Anna Poreda

Projekt okładki

Cover design

Robert Chmielewski

Centrum Informatyki Statystycznej

Statistical Computing Centre

ISSN 1230-588X

Publikacja dostępna na stronie internetowej

Publications available on website

stat.gov.pl

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła

When publishing Statistics Poland data — please indicate the source

Przedmowa

Z przyjemnością przekazujemy Państwu najnowszą edycję publikacji „Zwierzęta gospodarskie”, prezentującą wyniki badań dotyczących różnych aspektów chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz produkcji zwierzęcej. Opracowanie bazuje także na danych pochodzących ze źródeł administracyjnych w zakresie pogłowia bydła, owiec i kóz oraz na miesięcznej sprawozdawczości z ubojni zwierząt gospodarskich i wylęgarni drobiu. Dzięki temu publikacja tworzy kompleksowy obraz sytuacji w tym sektorze, ułatwiając monitorowanie zmian oraz wspierając procesy planowania i podejmowania decyzji.

Publikacja zawiera obszerny zestaw danych o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich zarówno dla kraju, jak i województw, a także dane miesięczne o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich i wylęgów drobiu w całym kraju. Zestawienia tabelaryczne (w formacie xlsx) umożliwiają szczegółową analizę zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a porównanie z danymi z poprzednich lat pozwala lepiej zrozumieć aktualne trendy i kierunki rozwoju polskiego rolnictwa. Całość uzupełniają uwagi metodyczne, które wyjaśniają podstawowe pojęcia i definiują zakres prezentowanych informacji o produkcji zwierzęcej.

Dziękujemy wszystkim respondentom oraz gestorowi danych administracyjnych za współpracę i udostępnienie informacji, dzięki którym powstała ta publikacja. Mamy nadzieję, że stanie się ona wartościowym źródłem wiedzy zarówno dla osób poszukujących gotowych analiz, jak i tych, którzy będą z niej korzystać w codziennej pracy.

Zachęcamy do dzielenia się uwagami i sugestiami, które pomogą nam doskonalić kolejne wydania tej publikacji. Zapraszamy również do korzystania z innych opracowań i baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, w tym z [Banku Danych Lokalnych](#) i [Dziedzinowych Baz Wiedzy](#).

Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Środowiska



Marta Wojciechowska

Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego



dr hab. Marek Cierpiat-Wolan

Preface

We are pleased to present to you the latest edition of the 'Livestock' publication showcasing research results on various aspects of livestock breeding and husbandry as well as animal production. The study also uses administrative data on the cattle, sheep, and goat populations in addition to monthly reports from livestock slaughterhouses and poultry hatcheries. This provides a comprehensive picture of the situation in the sector, facilitating the monitoring of changes and enhancing planning and decision-making processes.

The publication contains extensive data on the livestock population for both the whole country and voivodships, as well as monthly data on the volume of livestock slaughter and poultry production nationwide. Tabular summaries (in the xlsx format) allow a detailed analysis of changes in livestock production, while comparisons with data from previous years foster a better understanding of current trends and development directions in Polish agriculture. Methodological notes explain the basic concepts and determine the scope of the provided information on livestock production.

We would like to thank all the respondents and the manager of administrative data for their collaboration and sharing the information, which made this publication possible. We hope it will become a valuable source of knowledge both for readers seeking ready-made analyses and for those who will use it in their daily work.

We would like to encourage you to share your comments and suggestions on this publication, which will help us improve its subsequent editions. We would also like to recommend other studies and databases of Statistics Poland, including the [Local Data Bank](#) and the [Knowledge Databases](#).

Director
Agriculture and Environment Department



Marta Wojciechowska

President
Statistics Poland



Marek Cierpiat-Wolan, Assoc. Prof.

Spis treści

Contents

Przedmowa	3
Preface	4
Objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty	6
Symbols and main abbreviations	6
Uwagi metodyczne	7
Methodological notes	19
Schemat losowania prób	10
Sampling scheme	22
Załącznik – Tablice w formacie Excel	
Enclosure – tables in Excel format	

Objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty

Symbols and main abbreviations

Symbol Symbol	Opis Description
p. proc. pp.	punkt procentowy percentage point
tys. thous.	tysiąc thousand
mln mln	milion million
ha ha	hektar hectare
r. y	rok year
cd. cont.	ciąg dalszy continued
dok. comp.	dokończenie completion
tabl. tab.	tablica table
Znak #	dane ukryte ze względu na tajemnicę statystyczną necessity of maintaining statistical confidentiality
Kreska (-)	zjawisko nie wystąpiło magnitude zero
Zero (0,0)	zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 magnitude not zero but less than 0.05 of a unit
Kropka (.)	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych data not available or not reliable
Znak x	wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe not applicable or not reliable
„W tym” “Of which”	oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy indicates that not all elements of the sum are given

Uwagi metodyczne

1. Źródła danych

Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie:

- uogólnionych wyników reprezentacyjnych badań pogłównia drobiu¹ i świń² oraz produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych osób fizycznych,
- sprawozdań statystycznych z zakresu pogłównia zwierząt gospodarskich oraz produkcji zwierzęcej w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach z udziałem mienia sektora publicznego i prywatnego,
- rejestru administracyjnego - prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie pogłównia bydła, owiec i kóz,
- sprawozdań statystycznych z rzeźni i ubojni zwierząt gospodarskich,
- sprawozdań statystycznych z wylęgarni drobiu.

Badanie pogłównia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) przeprowadzono na próbie 30 tys. gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) utrzymujących drób lub krowy mleczne lub owce.

Badanie pogłównia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) przeprowadzono na próbie 30 tys. gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) utrzymujących świnię. Wyniki badań pogłównia zwierząt gospodarskich oraz produkcji zwierzęcej opracowane zostały w układzie wojewódzkim oraz regionów NUTS 2, według siedziby użytkownika gospodarstwa, tj. dla gospodarstw indywidualnych – według miejsca siedziby (zamieszkania) użytkownika, a dla gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek – według miejsca siedziby przedsiębiorstwa (gospodarstwa). Dane z rejestru administracyjnego ARiMR prezentowane są według siedziby stada.

2. Ważniejsze definicje, pojęcia i zasady spisywania

Gospodarstwo rolne – jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.

Do **działalności rolniczej** zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, dzikich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie dla produkcji mięsa (np. dziki, sarny, danielę) i pszczoł, a także działalność polegającą na utrzymaniu gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

Gospodarstwo rolne osoby fizycznej (gospodarstwo indywidualne) – to gospodarstwo użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych (UR) lub gospodarstwo poniżej 1 ha UR (w tym nieposiadające użytków rolnych), jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych progów:

- 0,5 ha dla plantacji drzew owocowych,
- 0,5 ha plantacji krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych, chmielu,
- 0,3 ha szkółek sadowniczych i ozdobnych,

¹Stałe badanie pogłównia drobiu prowadzone jest 1 raz w roku w grudniu

²Stałe badanie pogłównia świń prowadzone jest 2 razy w roku w czerwcu i grudniu

- 0,1 ha dla tytoniu,
- 5 szt. bydła ogółem,
- 20 szt. świń ogółem,
- 5 szt. loch,
- 20 szt. owiec i kóz ogółem,
- 100 szt. drobiu ogółem,
- 10 szt. dzikich zwierząt (np. dziki, sarny, danielę) utrzymywanych w gospodarstwie dla produkcji mięsa,
- 20 pni pszczelich.

Gospodarstwo rolne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej to gospodarstwo rolne prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którego podstawowa działalność jest zaliczana według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji A, dział 01, grupy:

- 01.1 - uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 01.2 - uprawy roślin wieloletnich,
- 01.3 - rozmnażanie roślin,
- 01.4 - chów i hodowla zwierząt,
- 01.5 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowla zwierząt (działalność mieszana),
- 01.6, klasa 01.61 – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska), a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych wynosi 1 ha i więcej lub prowadzony jest chów/hodowla zwierząt gospodarskich.

Za **użytkownika gospodarstwa rolnego** uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Zwierzęta gospodarskie

Badaniu podlegały zwierzęta gospodarskie znajdujące się w czasie badania w gospodarstwie rolnym oraz zwierzęta wystane na redyki, wypasy i do bacówek. Spisywano wszystkie zwierzęta, tj. stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na wychów, opas itp. niezależnie od tego, czy przyjęto je od gospodarstw osób fizycznych, czy od osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Krowy mleczne - samice bydła, które już się cielily (w tym w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji mleka do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

Krowy pozostałe - samice bydła, które już się cielily (w tym w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt i których mleko nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi ani do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

Dla gospodarstw rolnych o dużej skali chowu drobiu (np. ferma wielkotowarowa produkująca brojlery lub jaja konsumpcyjne), w których w dniu badania nie było na stanie drobiu w związku z trwającą właśnie przerwą technologiczną w produkcji, a przerwa ta nie przekraczała 8 tygodni, przyjmowano stany drobiu z okresu przed opróżnieniem pomieszczeń (kurników).

Informacje o pogłowie świń, bydła, owiec i kóz zawarte w niniejszej publikacji dotyczą stanów w czerwcu i grudniu, dane o pogłowie drobiu dotyczą stanu w grudniu.

Informacje liczbowe w ujęciu odsetkowym prezentowane z jednym znakiem po przecinku z uwagi na elektroniczną technikę zaokrągleń mogą nie sumować się (również na 100%). Liczby te są merytorycznie poprawne.

Dane administracyjne

Do 2021 r. dane dotyczące stanu pogłowa bydła i owiec opracowywane były na podstawie uogólnionych wyników badania R-ZW-B, które łączyło reprezentacyjne badanie pogłowa bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej w gospodarstwach osób fizycznych i sprawozdania statystyczne z zakresu pogłowa bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych osób prawnych, a także w jednostkach nie posiadających osobowości prawnej (państwowych, spółdzielczych i spółkach z udziałem mienia sektora publicznego i prywatnego). „Badanie pogłowa bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)” było przeprowadzane dwa razy w roku (tj. w czerwcu i w grudniu).

Od 2022 r. GUS zastąpił dane dot. pogłowa bydła i owiec pozyskiwane dotychczas z badania R-ZW-B danymi z rejestru administracyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późniejszymi zmianami.

Podstawą prawną umożliwiającą przekazanie danych m.in. o stanie pogłowa zwierząt gospodarskich z ARiMR do GUS są zapisy zawarte w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na dany rok.

Schemat losowania prób

Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej

1. Uwagi wstępne

Celem przeprowadzanego przez GUS raz w roku (tj. w grudniu danego roku) badania jest uzyskanie szczegółowych informacji o pogłowie drobiu oraz średniego pogłowia krów mlecznych (dojonych) i owiec (w tym maciorek mlecznych) według regionów, województw i dla Polski. Badaną populację stanowią gospodarstwa rolne osób fizycznych, które według danych dostępnych w operacie posiadały krowy mleczne lub drób lub owce. Badana populacja liczyła w 2025 roku 172,8 tys. gospodarstw. Założono, że próba do badania liczyć będzie około 30 tys. gospodarstw. Taka wielkość próby była konsekwencją uwzględnienia kilku czynników m.in.: kosztów realizacji badania, analizy danych z lat poprzednich oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości wyników na poziomie kraju i regionów.

2. Operat losowania

Przy tworzeniu operatu losowania wykorzystano Operat do Badań Rolniczych. Informacje o gospodarstwach rolnych zapisane w Operacie aktualizowane są danymi ze źródeł administracyjnych. Jednostką losowaną było gospodarstwo rolne osoby fizycznej (gospodarstwo indywidualne). Dla każdego gospodarstwa rolnego przypisane zostały następujące informacje:

- nr gospodarstwa rolnego,
- symbol województwa oraz regionu NUTS 2,
- powierzchnia ogólna gospodarstwa,
- powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie,
- liczba sztuk krów,
- liczba sztuk drobiu,
- liczba sztuk owiec.

3. Schemat losowania

Populacja gospodarstw rolnych została przed losowaniem podzielona na dwie podpopulacje. Do pierwszej z nich zaliczono gospodarstwa spełniające przynajmniej jeden z warunków, tj. posiadające przynajmniej 1 sztukę krów lub przynajmniej 1 sztukę drobiu oraz nie posiadające owiec. Ta część populacji liczyła 162 459 gospodarstw. Do drugiej podpopulacji zaliczono gospodarstwa posiadające tylko owce. Liczyła ona 10 316 gospodarstw rolnych.

W celu wylosowania próby zastosowany został schemat losowania warstwowego optymalnego, jako cechy warstwujące wykorzystano zmienne dostępne w operacie losowania i jednocześnie najbardziej odpowiadające definicji kluczowych cech określonych w ankiecie. Zakładane istnienie wysokiej korelacji pomiędzy zmiennymi przyjętymi do warstwowania, a zmiennymi badanymi (potwierdzone analizą danych historycznych) umożliwia optymalny dobór granic warstw i alokację próby w ramach schematu losowania warstwowego.

W pierwszej podpopulacji jako kryteria tworzenia warstw i alokacji próby pomiędzy warstwy przyjęto liczbę sztuk krów oraz liczbę sztuk drobiu. W drugiej podpopulacji warstwy tworzone były w oparciu o liczbę sztuk owiec. W każdym regionie pierwszej podpopulacji utworzono pięć warstw, natomiast w drugiej podpopulacji utworzono sześć warstw ogólnopolskich, tzn. obejmowały one gospodarstwa ze wszystkich regionów.

Spośród gospodarstw **pierwszej podpopulacji** wylosowano próbę liczącą około 27 tys. gospodarstw.

Przystępując do losowania próby z tej kategorii gospodarstw przyjęto następujące założenia:

- (1) liczebność próby n ustalona jest dla populacji gospodarstw w Polsce, a nie dla poszczególnych regionów, przy czym n liczy ok. 27 000 gospodarstw,
- (2) w poszczególnych regionach próba losowana jest według schematu losowania warstwowego – optymalnego przy wykorzystaniu metody Neymana,
- (3) w każdym regionie dokonywany jest jednocześnie podział populacji na 5 warstw ($h = 1, 2, \dots, 5$), oraz dokonuje się alokacji próby pomiędzy warstwy,
- (4) w każdym regionie do warstwy nr 5 (tj. $h = 5$) wydzielane są jednostki losowania o wartościach zmiennych przyjętych za podstawę warstwowania powyżej określonego progu. Utworzona w ten sposób tzw. górna warstwa zawiera jednostki, które nie są losowane, lecz wszystkie zaliczane są do próby, przyjęto, że oczekiwana precyzja wyników badania, mierzona współczynnikiem zmienności pogłowia krów albo drobiu będzie jednakowa dla każdego regionu i równa 1,0% (konkretny parametr liczbowy był ustalony empirycznie tak, aby spełnić narzucone ograniczenia na liczebność próby).

Powyższe założenia zostały uwzględnione przy wykorzystaniu metod optymalizacji numerycznej¹. Populacja podzielona została na warstwy, których granice (górne) wyrażone w liczbie sztuk krów oraz liczb sztuk drobiu przedstawione zostały w tablicy 1.

Tabl.1. Granice warstw według regionów w badaniu pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej w 2025 roku.

Kod regionu	B – krowy D - drób	b_1	b_2	b_3	b_4
PL51	B	4	12	24	107
	D	922	1017	1077	34201
PL61	B	6	17	30	56
	D	3632	3697	3754	3923
PL81	B	6	30	64	111
	D	4365	4437	63644	191606
PL43	B	9	21	39	39
	D	5581	5647	23785	34779
PL71	B	7	16	29	59
	D	4099	5201	5508	5510
PL21	B	2	7	18	131
	D	1694	1791	1845	64495
PL91	B	3	9	17	74
	D	5721	5787	6108	31256
PL92	B	9	24	64	72
	D	7617	8140	8258	39835

¹ Opis rozwiązania tego zadania przedstawiony został w artykule: Lednicki B., Wieczorkowski R. (2003). Optymalna alokacja próby pomiędzy subpopulacje i warstwy. *Wiadomości Statystyczne*, nr 10, 18-26.

PL52	B	5	15	29	153
	D	3633	3851	3902	26699
PL82	B	3	9	62	69
	D	2266	2308	33720	42420
PL84	B	14	32	66	1243
	D	3705	3912	3931	4002
PL63	B	7	26	43	88
	D	3436	3717	23411	85174
PL22	B	6	18	94	106
	D	3896	3901	38675	48299
PL72	B	4	9	19	84
	D	2771	2803	2819	20278
PL62	B	9	23	50	258
	D	4753	4810	4844	48234
PL41	B	8	27	74	75
	D	6344	6723	6738	30107
PL42	B	6	16	29	58
	D	3500	11425	14700	31882

Przedstawione w tabl.1. granice warstwy 4 (b_4) stanowią jednocześnie **próg** powyżej którego gospodarstwa zaliczane są do warstwy 5 czyli nie podlegają losowaniu, lecz wszystkie zaliczane są do próby. Dla pozostałych warstw tj. $h = 1, 2, 3, 4$ ustalone zostały, zgodnie z metodą optymalnej alokacji Neymana, wartości n_{wh} tj. liczebności prób losowanych z h -tej warstwy w w -tym regionie.

Do próby wylosowano następnie, zgodnie z przyjętą alokacją, 27 273 gospodarstw, w tym 5 633 gospodarstwa z warstwy nr 5.

W drugiej podpopulacji, w której utworzono 6 warstw ogólnopolskich ($h = 6, 7, \dots, 11$), wylosowano do próby 2 727 gospodarstw. Z warstwy 11 do próby zaliczono wszystkie gospodarstwa (tzn. 59). Były to bowiem gospodarstwa posiadające owce, a jednocześnie posiadające 50 lub więcej sztuk krów lub co najmniej 400 sztuk drobiu. Granice pozostałych warstw oraz alokację założonej liczebności próby pomiędzy warstwy wyznaczono przy wykorzystaniu wspomnianej wyżej metody optymalizacji numerycznej. Wydzielona została warstwa górna ($h = 10$), z której nie losowano gospodarstw. Do warstwy tej zaliczono gospodarstwa, nie zaliczone wcześniej do warstwy 11 i posiadające powyżej 27 sztuk owiec. Górne granice pozostałych warstw były następujące: $b_6 = 3$, $b_7 = 8$, $b_8 = 15$, $b_9 = 27$. Celem wydzielenia tej kategorii gospodarstw oraz optymalizacji podziału na warstwy było precyzyjne oszacowanie danych dotyczących pogłowia owiec w skali kraju, bez przekrojów regionalnych. Ostatecznie cała próba do badania bydła, drobiu i owiec liczyła 30 000 gospodarstw.

4. Uogólnianie wyników i metoda oceny precyzji

Podstawowym parametrem szacowanym w badaniu pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej jest suma wartości zmiennej X np. pogłowie krów ogółem.

Parametr ten dla w -tego regionu jest następujący:

$$(1) \hat{x}_w = \sum_h \sum_i W1_{whi} * x_{whi}, (i = 1, 2, \dots, n_{wh}; h = 1, 2, \dots, 11),$$

gdzie:

x_{whi} – wartość zmiennej X w i -tym gospodarstwie (jednostce losowania) wylosowanym z h -tej warstwy w w -tym regionie,

$W1_{whi}$ – waga przypisana i -temu gospodarstwu wylosowanemu z h -tej warstwy w w -tym regionie, przy czym waga ta obliczana jest ze wzoru:

$$(2) W1_{whi} = \frac{N_{wh}}{n_{wh}},$$

N_{wh} – liczba jednostek losowania w operacji w h -tej warstwie w -tego regionu,

n_{wh} – liczba jednostek losowania wylosowanych do próby z h -tej warstwy w -tego regionu,

Waga $W1_{whi}$ może być stosowana do estymacji wyników badania tylko wtedy, gdy badanie jest zrealizowane dla wszystkich jednostek wylosowanych do próby. Waga ta musi być korygowana, jeżeli część gospodarstw wylosowanych do próby odmawia udziału w badaniu. W tym celu wylosowaną próbę na podstawie informacji o realizacji badania dzielimy na 4 grupy:

- 1) gospodarstwa zbadane,
- 2) gospodarstwa, które odmówiły udziału w badaniu,
- 3) gospodarstwa zlikwidowane,
- 4) gospodarstwa, z którymi nie nawiązano kontaktu podczas realizacji badania.

Dla każdej warstwy, oddzielnie w każdym regionie, ustalamy liczebności powyższych grup tj.: $n1_{wh}, n2_{wh}, n3_{wh}$ i $n4_{wh}$, po czym ustalamy frakcję gospodarstw zbadanych i gospodarstw niezbadanych wśród gospodarstw o ustalonym statusie, czyli:

$$(3) c_{wh} = \frac{n1_{wh} + n2_{wh}}{n_{wh} - n4_{wh}}.$$

Następnie obliczamy, dla wylosowanej próby, liczbę gospodarstw aktywnych n_{awh} w h -tej warstwie w -tego regionu:

$$(4) n_{awh} = n1_{wh} + n2_{wh} + c_{wh} * n4_{wh}.$$

Na tej podstawie, dla danej warstwy, obliczany jest mnożnik korygujący R_{wh} :

$$(5) R_{wh} = \frac{n_{awh}}{n1_{wh}}.$$

Mnożnik ten służy do korekty wagi $W1_{whi}$ w celu uzyskania wagi końcowej W_{whi} :

$$(6) W_{whi} = R_{wh} * W1_{whi}.$$

Ocena sumy zmiennej X dla Polski jest sumą wartości uzyskanych dla regionów tj.:

$$(7) \hat{x} = \sum_w \hat{x}_w, (w = 1, 2, \dots, 17).$$

Wagi pierwotne wynikające z losowania próby, korygowane są nie tylko ze względu na niepełną kompletność badania, ale również ze względu na występowanie tzw. gospodarstw nietypowych (*ang. outlier*). Dotyczy to gospodarstw, którym przypisano dużą wagę (losowanych z dużą frakcją), a jednocześnie ze stosunkowo dużymi wartościami dla niektórych badanych zmiennych. Korekta wagi ma zapobiegać w tym wypadku znacznemu przeszacowaniu wartości badanej zmiennej.

Wagi były dodatkowo kalibrowane uwzględniając dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o liczbie sztuk na poziomie kraju dla następujących zmiennych: drób kurzy ogółem, brojlery, nioski kurze ogółem, nioski kurze do produkcji jaj konsumpcyjnych, gęsi, indyki, kaczki.

Dla wybranych ważniejszych ocen parametrów oszacowane zostały, jako miary precyzji, ich współczynniki zmienności (względne błędy standardowe). W przypadku estymatora wyrażonego wzorem (1), tj. dla w -tego regionu oszacowanie jego współczynnika zmienności przedstawia się następująco:

$$(8) v(\hat{x}_w) = \frac{\sqrt{d^2(\hat{x}_w)}}{\hat{x}_w},$$

gdzie $d^2(x_w)$ jest oszacowaniem tzw. wariancji estymatora $\hat{x}_w$ i oblicza się według wzoru (formuła wynika z klasycznej teorii metody reprezentacyjnej dla schematu losowania warstwowego):

$$(9) d^2(\hat{x}_w) = \sum_h \left(1 - \frac{n_{1wh}}{\sum_i W_{whi}}\right) \frac{n_{1wh}}{n_{1wh}-1} \sum_i \left(W_{whi} x_{whi} - \frac{\sum_j W_{whj} x_{whj}}{n_{1wh}}\right)^2.$$

Dla Polski współczynnik zmienności sumy X szacowanej wg wzoru (7) wyrażony jest wzorem:

$$(10) v(\hat{x}) = \frac{\sqrt{d^2(\hat{x})}}{\hat{x}},$$

zaś wariancja

$$(11) d^2(\hat{x}) = \sum_w d^2(\hat{x}_w).$$

W tablicach prezentujących precyzje oszacowań współczynniki zmienności podane są w procentach.

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

1. Uwagi wstępne

Celem przeprowadzanych przez GUS dwa razy w roku (tzn. w czerwcu oraz w grudniu) badań pogłowia świń jest uzyskanie szczegółowych informacji o pogłowie trzody chlewnej według regionów, województw oraz dla Polski. Badaną populację stanowią indywidualne gospodarstwa rolne, które według danych dostępnych w operacie posiadały trzodę chlewną. W 2025 r. badana populacja liczyła około 47,9 tys. gospodarstw rolnych. Założono, że próba do badania liczyć będzie około 30 tys. gospodarstw. Taka wielkość próby była konsekwencją uwzględnienia kilku czynników m.in.: kosztów realizacji badania, analizy danych z lat poprzednich oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości wyników na poziomie kraju i województw.

2. Operat losowania

Przy tworzeniu operatu losowania wykorzystano Operat do Badań Rolniczych. Informacje o gospodarstwach rolnych zapisane w Operacie aktualizowane są danymi ze źródeł administracyjnych. Jednostką losowaną było gospodarstwo rolne osób fizycznych (gospodarstwo indywidualne). Dla każdego gospodarstwa zapisane zostały następujące informacje:

- nr gospodarstwa,
- symbol województwa oraz regionu NUTS 2,
- powierzchnia ogólna gospodarstwa,
- powierzchnia użytków rolnych,
- liczba sztuk trzody chlewnej.

3. Schemat losowania

W celu wylosowania próby zastosowany został schemat losowania warstwowego - optymalnego. Spośród gospodarstw prowadzących chów/hodowlę trzody chlewnej wylosowano próbę liczącą 30 tys. gospodarstw rolnych.

Przystępując do losowania próby z tej kategorii gospodarstw przyjęto następujące założenia:

- (1) liczebność próby n ustalona jest dla populacji gospodarstw w Polsce, a nie dla poszczególnych regionów, przy czym n liczy ok. 30 tys. gospodarstw,
- (2) w poszczególnych regionach próba losowana jest według schematu losowania warstwowego - optymalnego wg metody Neymana,
- (3) w każdym regionie dokonywany jest najpierw podział populacji na 3 warstwy ($h = 1, 2, 3$), po czym dokonuje się alokacji próby pomiędzy warstwy,
- (4) w każdym regionie do warstwy nr 3 (tj. $h = 3$) wydzielane są jednostki losowania o wartościach zmiennej przyjętej za podstawę warstwowania powyżej określonego progu. Utworzona w ten sposób tzw. górna warstwa zawiera jednostki, które nie są losowane, lecz wszystkie zaliczane są do próby,
- (5) przyjęto, że oczekiwana precyzja wyników badania, mierzona współczynnikiem zmienności pogłowia trzody będzie jednakowa dla każdego regionu i równa 0,15% (konkretny parametr liczbowy jest ustalony empirycznie tak, aby spełnić narzucone ograniczenia na liczebność próby).

Powyższe założenia zostały uwzględnione przy wykorzystaniu metod optymalizacji numerycznej. Populacja podzielona została na warstwy, których granice (górne) wyrażone w liczbie sztuk trzody przedstawione zostały w tablicy 2.

Tabl. 2. Granice warstw według regionów w badaniu pogłowia trzody w 2025 roku.

Kod regionu	b_1	b_2
021	6	12
041	16	34
061	7	19
081	8	688
101	25	415
121	5	8
141	90	350
142	31	1420
161	14	253
181	4	29
201	13	823
221	10	26
241	7	84
261	8	15
281	29	1297
301	20	49
321	5	11

Przedstawiona w tabl. 2. granica warstwy 2 (b_2) stanowi jednocześnie próg, powyżej którego jednostki losowania zaliczane są do warstwy 3, czyli nie podlegają losowaniu, lecz badane są w 100%. Dla pozostałych warstw tj. $h = 1, 2$, ustalone zostały, zgodnie z metodą optymalnej alokacji Neymana, wartości n_{wh} tj. liczebności prób losowanych z h -tej warstwy w w -tym regionie.

Do próby wylosowano następnie, zgodnie z przyjętą alokacją, 30 000 gospodarstw, w tym 15 515 gospodarstwa z warstwy nr 3.

4. Uogólnianie wyników i metoda oceny precyzji

Podstawowym parametrem szacowanym w badaniu pogłowia trzody jest suma wartości zmiennej X np. pogłowie trzody ogółem.

Parametr ten dla w -tego regionu jest postaci:

$$(1) \hat{x}_w = \sum_h \sum_i W1_{whi} * x_{whi}, (i = 1, 2, \dots, n_{wh}; h = 1, 2, 3)$$

gdzie:

x_{whi} – wartość zmiennej X w i -tym gospodarstwie (jednostce losowania) wylosowanym z h -tej warstwy w w -tym regionie,

$W1_{whi}$ – waga przypisana i -temu gospodarstwu wylosowanemu z h -tej warstwy w w -tym regionie, przy czym waga

ta obliczana jest ze wzoru:

$$(2) W1_{whi} = \frac{N_{wh}}{n_{wh}},$$

N_{wh} – liczba jednostek losowania w operacji w h -tej warstwie w -tego regionu,

n_{wh} – liczba jednostek losowania wylosowanych do próby z h -tej warstwy w -tego regionu,

Waga $W1_{whi}$ może być stosowana do estymacji wyników badania tylko wtedy, gdy badanie jest zrealizowane dla wszystkich jednostek wylosowanych do próby. Waga ta musi być korygowana, jeżeli część gospodarstw wylosowanych do próby odmawia udziału w badaniu. W tym celu wylosowaną próbę na podstawie informacji o realizacji badania dzielimy na 4 grupy:

- 1) gospodarstwa zbadane,
- 2) gospodarstwa, które odmówiły udziału w badaniu,
- 3) gospodarstwa zlikwidowane,
- 4) gospodarstwa, z którymi nie nawiązano kontaktu podczas realizacji badania.

Dla każdej warstwy, oddzielnie w każdym województwie, ustalamy liczebności powyższych grup tj.: $n1_{wh}$, $n2_{wh}$, $n3_{wh}$ i $n4_{wh}$, po czym ustalamy frakcję gospodarstw zbadanych i gospodarstw niezbadanych wśród gospodarstw o ustalonym statusie, czyli:

$$(3) c_{wh} = \frac{n1_{wh} + n2_{wh}}{n_{wh} - n4_{wh}}.$$

Następnie obliczamy, dla wylosowanej próby, liczbę gospodarstw aktywnych n_{awh} w h -tej warstwie w -tego województwa:

$$(4) n_{awh} = n1_{wh} + n2_{wh} + c_{wh} * n4_{wh}.$$

Na tej podstawie, dla danej warstwy, obliczany jest mnożnik korygujący R_{wh} :

$$(5) R_{wh} = \frac{n_{awh}}{n1_{wh}}.$$

Mnożnik ten służy do korekty wagi $W1_{whi}$ w celu uzyskania wagi końcowej W_{whi} :

$$(6) W_{whi} = R_{wh} * W1_{whi}.$$

Ocena sumy zmiennej X dla Polski jest sumą wartości uzyskanych dla regionów tj.:

$$(7) \hat{x} = \sum_w \hat{x}_w, (w = 1, 2, \dots, 17).$$

Wagi pierwotne wynikające z losowania próby, korygowane są nie tylko ze względu na niepełną kompletność badania ale również ze względu na występowanie tzw. gospodarstw nietypowych (*ang. outlier*). Dotyczy to gospodarstw, którym przypisano dużą wagę (losowanych z dużą frakcją), a jednocześnie ze stosunkowo dużymi wartościami dla niektórych badanych zmiennych. Korekta wagi ma zapobiegać w tym wypadku znacznemu przeszacowaniu wartości badanej zmiennej.

Wagi były dodatkowo kalibrowane uwzględniając dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o liczbie sztuk trzody na poziomie regionów.

Do oszacowania precyzji uogólnień z badania pogłowia świń zastosowano formuły opisane w części dotyczącej badania pogłowia drobiu, bydła (krów) i owiec.

W tablicy 3 podano wartości względnych błędów standardowych dla wybranych badanych zmiennych.

Tabl. 3. Wartości względnego błędu standardowego dla wybranych zmiennych dla Polski – na podstawie wyników reprezentacyjnego badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego zrealizowanych w grudniu 2025 roku.

Nr kolejny zmiennej	Nazwa zmiennej	Względny błąd standardowy
1.	Krowy dojone	0,0
2.	Maciorki dojone	3,0
3.	Świnie ogółem	0,0
4.	Lochy ogółem	1,0
5.	Drób kurzy	0,0
6.	Nioski kurze	0,0

Methodological notes

1. Sources of data

The data in this publication were compiled on the basis of:

- generalized results of sample surveys^{1,2} on poultry and pigs, as well as, the animal output in private farms,
- statistical reports in the scope of livestock in state and cooperative farms and companies with public and private property share,
- administrative register the Agriculture Restructurisation and Modernisation Agency (ARMA) as regards of cattle, sheep and goats,
- statistical reports from slaughterhouses of livestock,
- statistical reports from poultry hatcheries.

Surveys on poultry population and animal output were conducted in private farms breeding the above-listed species of animals (poultry, cows and sheep), this sample amounted to 30 thousand farms.

Surveys on pigs and production of pigs for slaughter were carried out in a sample of private farms breeding pigs; this sample amounted to 30 thousand farms.

The results of the survey of livestock stocks and animal output were compiled by voivodship and NUTS 2 regions, according to the residence of the farm user, i.e. for private farms - according to the official residence (place of residence) of the farm user, while for state owned farms, cooperative farms and companies – according to the official residence of the holding. Data from the administrative register of the ARMA are presented according to the seat of the herd.

2. Major definitions, terms and enumeration rules

Agricultural holding is understood as an organised economic and technical unit with separate management (a holder or a manager), conducting agricultural activity.

Agricultural activity includes activity associated with crop production, which covers: all agricultural crops (including mushroom production), vegetable production and horticulture, arboriculture, agricultural and horticultural crop and seed production, as well as animal production in a holding, i.e. cattle, sheep, goats, horses, pigs, poultry, rabbits, other fur animals, game kept for slaughter, bees, and activity consisting of maintaining unused agricultural land for production purposes according to the rules of a good agricultural conditions in compliance with environmental protection requirements.

Natural person's holding (private farm) is understood as a holding used by a natural person with an area of 1.0 ha or more of agricultural land, or a holding of the area of less than 1.0 ha of agricultural land (including holdings without agricultural land), which meets at least one of the thresholds mentioned below:

¹The survey on poultry stock is conducted once a year, in December.

²The survey on pig stock is conducted twice a year, i.e. in June and in December.

- 0.5 ha of fruit trees plantation,
- 0.5 ha of fruit shrubs plantation, soil-grown vegetables, soil-grown strawberries, hop,
- 0.3 ha of fruit and ornamental nurseries,
- 0.1 ha of tobacco,
- 5 head of cattle in total,
- 20 head of pigs in total,
- 5 head of sows,
- 20 head of sheep and goats in total,
- 100 head of poultry in total,
- 10 head of wild animals (e.g. wild boars, roe deer, fallow deer) kept for slaughter,
- 20 beehives.

The holding of a legal person or an organisational unit without a legal personality is an agricultural holding run by legal person or an organisational unit without legal personality, the basic activity of which is classified, according to the Polish Classification of Activities, to Section A, division 01, group:

- 01.1 – growing of non-perennial crops,
- 01.2 – growing of perennial crops,
- 01.3 – plant propagation,
- 01.4 – animal production,
- 01.5 – mixed farming,
- 01.6, class 01.61 – support activities for crop production (maintaining the land in accordance with cultivation principles with respect for environment protection requirements), and also, irrespective of the basic activity classification, when the area of agricultural land used by the holding is 1 ha or more or when livestock is reared or bred.

Holder of an agricultural farm is understood as a natural person or a legal person or an organisational unit without a legal personality actually using the farm, regardless of whether he or she is an owner or a leaseholder, or uses the farm in any other respect, and regardless of whether land constituting the farm is situated in one or in several gminas.

Livestock

The survey covered the livestock staying in the agricultural holding during the survey, as well as animals sent to herding, grazing and shepherd's huts. All animals were registered, i.e. the ones owned by a holder or members of his/her household, as well as animals temporarily or permanently kept in the holding, i.e. taken for rearing, fattening, etc., irrespective whether they were taken from private holdings, state-owned holdings, cooperative entities, or companies.

Dairy cows - heads of female bovine animals which have already calved (including those less than 2 years old) and which, by reason of their breed or particular qualities, are kept exclusively or principally to produce milk for human consumption or for processing into dairy products.

Other cows - heads of female bovine animals which have already calved (including those less than 2 years old) and which, by reason of their breed or particular qualities, are kept exclusively or principally for the production of calves and whose milk is not intended for human consumption nor for processing into dairy products.

In the case of holdings engaged in the production of poultry on a large scale (such as a large-scale holding producing broilers or hen eggs), in which no poultry has been recorded on the survey day due to the current technological break in production, whenever such break does not exceed 8 weeks, the poultry stocks from the period before emptying the rooms (poultry houses) have been adopted.

Information on the number of pigs, cattle, sheep and goats contained in this publication refers to the stock in June and in December. Data on number of poultry refers to the stock in December.

The percentages are presented with one decimal point and due to the electronic technique of rounding may not sum up into 100%. These figures are substantially correct.

Administrative data

Until 2021, data on the stock of cattle and sheep were compiled on the basis of the generalized results of the R-ZW-B survey, which combined a representative survey of the stock of cattle, sheep and poultry as well as livestock production in individual farms and statistical reports on the stock of cattle, sheep and poultry and animal production on farms of legal persons, as well as in entities without legal personality (state-owned, cooperative and companies with the share of public and private sector property). The "Survey of cattle, sheep and poultry stocks and livestock production (R-ZW-B)" was carried out twice a year (i.e. in June and December).

From 2022, the Statistics Poland replaced the above-mentioned livestock data obtained so far from the R-ZW-B survey with administrative data from the Agriculture Restructurisation and Modernisation Agency (ARMA) in accordance with the Act of 2 April 2004 on the system of identification and registration of animals, as amended.

The legal basis enabling the transfer of data, among others about the livestock from the ARMA to the Statistics Poland are records in the Program of Statistical Research of Public Statistics (PBSSP) for a given year.

Sampling scheme

Survey on the livestock of poultry and animal production

1. Introductory notes

The purpose of the survey conducted by the Statistics Poland once a year (i.e. in December) is to obtain detailed information on the number of poultry and the average population of dairy cows (milked) and sheep (including dairy ewes) by regions, voivodships and for Poland. The surveyed population consists of private agricultural farms which, according to the sampling frame were keeping cows, or poultry, or sheep. The surveyed population in 2025 consisted of 172.8 thousand farms. It was assumed that the sample for the survey would consist of about 30,000 farms. This sample size was a consequence of taking into account several factors: the costs of the study, the analysis of data from previous years and the need to ensure the quality of results at the national and regional level.

2. Sampling frame

The Agricultural Research Frame was used to create the sampling frame. Information on farms in this frame are updated using data from administrative sources. An individual agricultural farm constituted a sampling unit. The following information was recorded for each farm voivodship:

- farm number,
- code and NUTS 2 region code,
- total farm area,
- agricultural land in the farm,
- number of cows,
- number of poultry,
- number of sheep.

3. Sampling scheme

Before sampling, the population of farms was divided into two subpopulations. The first subpopulation included farms fulfilling at least one of the following criteria, i.e. farms with at least one head of cows or farms with at least one head of poultry and without sheep. This part of population included 162 459 farms. The second part of population included farms keeping sheep, and it amounted to 10 316 farms.

Sample drawing was done with a stratified and optimal sampling scheme. Variables available in the sampling frame and at the same time most closely corresponding to the definition of the key characteristics defined in the survey were used as stratifying characteristics; the assumed existence of a high correlation between the variables adopted for stratification and the survey variables (confirmed by the analysis of historical data) allows for optimal selection of stratum boundaries and sample allocation within the stratified sampling scheme.

The number of cows and poultry was used in the first part of the population as the criteria for stratification and allocation of the sample between the strata. In the second part, the strata were established on the basis of the number of head of sheep. There were created 5 strata in each region of the first subpopulation, and in the

second subpopulation, 6 national strata were established, i.e. strata that covered farms from all regions.

It was decided that from the first subpopulation farms a sample consisting of approx. 27 thousand farms will be drawn.

The following assumptions were made while drawing the sample from this category of farms:

- (1) the size of sample n established for the population of farms in Poland, and not for individual regions, where n consists of approx. 27 000 farms,
- (2) the sample is drawn in individual regions according to the stratified and optimal sampling scheme, with the use of the Neyman method,
- (3) the population in each region is first divided into 5 strata ($h = 1, 2, \dots, 5$), and the sample is then allocated between these strata,
- (4) stratum no. 5 (i.e. $h = 5$) in each region consists of such sampling units for which the value of variables adopted as the stratification basis is above the specified threshold. The stratum created in this way, so called the upper stratum, includes the units which are not drawn, but which are all included in the sample, it has been assumed that the expected accuracy of the survey results, measured with the variation coefficient of the livestock of cows or poultry, will be identical for each region and will be approximately equal to 1.0% (a specific numerical parameter was set empirically to meet the imposed limits on the sample size).

The above assumptions were taken into account using numerical optimization methods. The population was divided into strata whose boundaries (upper) expressed in the number of cows and poultry are presented in Table 1.

Table 1. Boundaries of strata by region in the survey on the livestock of poultry and animal production in 2025.

NUTS 2	B – cows D - poultry	b_1	b_2	b_3	b_4
PL51	B	4	12	24	107
	D	922	1017	1077	34201
PL61	B	6	17	30	56
	D	3632	3697	3754	3923
PL81	B	6	30	64	111
	D	4365	4437	63644	191606
PL43	B	9	21	39	39
	D	5581	5647	23785	34779
PL71	B	7	16	29	59
	D	4099	5201	5508	5510
PL21	B	2	7	18	131
	D	1694	1791	1845	64495
PL91	B	3	9	17	74
	D	5721	5787	6108	31256

PL92	B	9	24	64	72
	D	7617	8140	8258	39835
PL52	B	5	15	29	153
	D	3633	3851	3902	26699
PL82	B	3	9	62	69
	D	2266	2308	33720	42420
PL84	B	14	32	66	1243
	D	3705	3912	3931	4002
PL63	B	7	26	43	88
	D	3436	3717	23411	85174
PL22	B	6	18	94	106
	D	3896	3901	38675	48299
PL72	B	4	9	19	84
	D	2771	2803	2819	20278
PL62	B	9	23	50	258
	D	4753	4810	4844	48234
PL41	B	8	27	74	75
	D	6344	6723	6738	30107
PL42	B	6	16	29	58
	D	3500	11425	14700	31882

The boundaries of stratum 4 (b_4) presented in Table 1, constitute also a threshold above which the farms are included in stratum 5, which means that they are not subject to sampling, but are all included in the sample. For other strata, i.e. $h = 1, 2, 3, 4$, the Neyman optimal allocation method was applied for establishing the values of n_{wh} i.e. size of the samples drawn from the h -stratum in w -region.

After that, 27 273 farms were drawn to the sample, based on the assumed allocation, including 5 633 farms from stratum no. 5.

In the **second subpopulation**, in which 6 national strata were established ($h = 6, 7, \dots, 11$), 2 727 farms were drawn for the sample. All farms from stratum 11 were included in the sample. These were farms keeping sheep and simultaneously 50 or more head of cows, or at least 400 head of poultry (i.e. 59 farms). The boundaries of other strata, and the assumed number of the sample allocated between these strata, were established with the above mentioned numerical optimization method. The upper stratum ($h = 10$) was also established, from which no farms were drawn. This stratum included farms which had not been previously included in stratum 11, and which kept more than 27 head of sheep. The upper boundaries of the remaining strata were the following: $b_6 = 3$, $b_7 = 8$, $b_8 = 15$, $b_9 = 27$. The aim of establishing this category of farms as a separate one, as well as optimizing the division into strata, was to accurately estimate the data on the livestock of sheep in country terms, with no regional breakdown.

Eventually, the entire sample for the survey on cattle, poultry and sheep consisted of 30 000 farms.

4. Results generalization and the accuracy assessment method

The sum of X variable value, such as cows stock in total, is the basic parameter estimated in the survey of livestock of poultry stocks and livestock production.

This parameter for w -region is calculated according to the formula:

$$(1) \hat{x}_w = \sum_h \sum_i W1_{whi} * x_{whi}, (i = 1, 2, \dots, n_{wh}; h = 1, 2, \dots, 11)$$

where:

x_{whi} – the value of X variable in i -farm (sampling unit) drawn from h -stratum in w -region,

$W1_{whi}$ – the weight assigned to i -farm drawn from h -stratum of w -region, whereas this weight is calculated according to this formula:

$$(2) W1_{whi} = \frac{N_{wh}}{n_{wh}},$$

N_{wh} – the number of sampling units in h -stratum of w -region,

n_{wh} – the number of sampling units drawn for the sample from h -stratum of w -region.

The $W1_{whi}$ weight might be used to estimate the survey results only if the survey is realized for all sampled units. This weight must be corrected if some of the sampled farms refuse to participate in the survey. For this purpose, the drawn sample is divided into 4 groups based on information on the survey performance:

the surveyed farms,

- (1) farms that refused to participate in the survey,
- (2) closed down farms,
- (3) farms with which the contact was not established during the survey performance.

For each stratum separately in each region, the size of the above groups, namely $n1_{wh}$, $n2_{wh}$, $n3_{wh}$, and $n4_{wh}$ is established, and then the likelihood function of surveyed and not surveyed among the farms with a determined status is established, that is:

$$(3) c_{wh} = \frac{n1_{wh} + n2_{wh}}{n_{wh} - n4_{wh}}.$$

Then the number of the n_{awh} active farms in h -stratum of w -region is calculated for the drawn sample:

$$(4) n_{awh} = n1_{wh} + n2_{wh} + c_{wh} * n4_{wh}$$

On this basis, the R_{wh} correction factor is calculated for a given stratum:

$$(5) R_{wh} = \frac{n_{awh}}{n1_{wh}}$$

The purpose of this factor is to correct the $W1_{whi}$ weight in order to obtain final W_{whi} weight:

$$(6) W_{whi} = R_{wh} * W1_{whi}$$

The sum of X variable value for Poland is the sum of values obtained for particular regions, i.e.:

$$(7) \hat{x} = \sum_w \hat{x}_w, (w = 1, 2, \dots, 17)$$

Original weights resulting from sampling are corrected not only due to incompleteness of the survey but also due to the occurrence of so called unusual farms (outliers). This pertains to farms with high assigned weight

(drawn with a high likelihood function) and, at the same time, with relatively high values for some of the analyzed variables. In this case, the weight correction is to prevent significant overestimation of the value of the surveyed variable.

The weights were additionally calibrated taking into account data from the Agriculture Restructurisation and Modernisation Agency (ARMA) on the number of animals at the national level for the following variables: total poultry, broilers, total laying hens, laying hens for table egg production, geese, turkeys, and ducks.

For the selected major assessments of the parameters, their variation coefficients were calculated as the accuracy measures. For an estimator expressed by formula (1) i.e. for w -region, its variation coefficient estimation is expressed in the following formula:

$$(8) v(\hat{x}_w) = \frac{\sqrt{d^2(\hat{x}_w)}}{\hat{x}_w},$$

where $d^2(x_w)$ is an estimate of the so-called variance of the estimator $\hat{x}_w$ and is calculated according to the formula (which follows from the classical survey sampling theory for stratified sampling scheme):

$$(9) d^2(\hat{x}_w) = \sum_h \left(1 - \frac{n_{1wh}}{\sum_i W_{whi}}\right) \frac{n_{1wh}}{n_{1wh}-1} \sum_i \left(W_{whi} x_{whi} - \frac{\sum_j W_{whj} x_{whj}}{n_{1wh}}\right)^2.$$

For Poland the variation coefficient of the sum X estimated with the formula (7) is expressed by the following formula:

$$(10) v(\hat{x}) = \frac{\sqrt{d^2(\hat{x})}}{\hat{x}},$$

whereas variance equals:

$$(11) d^2(\hat{x}) = \sum_w d^2(\hat{x}_w).$$

In the tables presenting the precision of the estimates, the coefficients of variation are given as a percentage.

Survey on pigs

1. Introductory notes

The purpose of the survey on pigs stocks, conducted by the Statistics Poland twice a year in June and December, is to obtain detailed information on the number of pigs by regions, voivodships and for Poland. The surveyed population consisted of individual farms which, according to the data available in the sampling frame, were keeping pigs. The surveyed population in 2025 consisted of 47.9 thousand farms. It was assumed that the sample for the survey would consist of about 30,000 farms. This sample size was a consequence of taking into account several factors: the costs of the study, the analysis of data from previous years and the need to ensure the quality of results at the national and regional level.

2. Sampling frame

The Agricultural Research Frame was used to create the sampling frame. Information on farms in this frame are updated using data from administrative sources. An individual agricultural farm constituted a sampling unit. The following information was recorded for each farm voivodship:

- farm number,
- voivodship code and NUTS 2 region code,
- total farm area,
- agricultural land,
- number of pigs.

3. Sampling scheme

In order to draw sample, a stratified sampling and optimal scheme was used with respect to farms which, according to the sampling frame, reared pigs. It was decided that a sample consisting of approx. 30 thousand farms will be drawn from all farms breeding and rearing pigs.

The following assumptions were made while drawing the sample from this category of farms:

- (1) the size of n sample is established for the population of farms in Poland, and not for individual regions, where n consists of approx. 30 thousand farms,
- (2) the sample is drawn in individual regions according to the stratified and optimal sampling scheme, by means of the Neyman method,
- (3) the population in each region is first divided into 4 strata ($h = 1, 2, 3$), and then the sample is allocated between these strata,
- (4) stratum no. 3 (i.e. $h = 3$) in each region consists of such sampling units, for which the value of at least one of the variables adopted as the stratification basis is above the specified threshold. The stratum created this way, regarded as the upper stratum, includes the units which are not drawn, but which are all included in the sample,
- (5) it has been assumed that the expected accuracy of the survey results, measured with the variation coefficient of the livestock of pigs, will be identical for each region and will be equal approximately to 0.15% (a specific numerical parameter was set empirically to meet the imposed limits on the sample size).

The above assumptions were taken into account using numerical optimization methods. The population was divided into strata whose boundaries (upper) expressed in the number of pigs were presented in Table 2.

Table 2. Boundaries of strata by region in the survey on pigs stock in 2025.

NUTS 2	b_1	b_2
PL51	6	12
PL61	16	34
PL81	7	19
PL43	8	688
PL71	25	415
PL21	5	8
PL91	90	350
PL92	31	1420
PL52	14	253
PL82	4	29
PL84	13	823
PL63	10	26
PL22	7	84
PL72	8	15
PL62	29	1297
PL41	20	49
PL42	5	11

The boundary of stratum 2 (b_2), presented in Table 2, also constitutes a threshold, above which the sampling units are included in stratum 3, which means they are not subject to sampling, but are all included in the sample. For other strata, i.e. $h = 1, 2$, the Neyman optimal allocation method was employed for establishing the values of n_{wh} , i.e. size of the samples drawn from the h -stratum in w -region. After that, 30 000 farms were drawn to the sample, based on the assumed allocation, including 15 515 farms from stratum no. 3.

4. Results generalization and the accuracy assessment method

The sum of X variable value, such as pigs stock in total, is the basic parameter estimated during the survey on the livestock of pigs.

This parameter for w -region is calculated according to the formula:

$$(1) \hat{x}_w = \sum_h \sum_i W 1_{whi} * x_{whi}, (i = 1, 2, \dots, n_{wh}; h = 1, 2, 3)$$

where:

x_{whi} – the value of X variable in i -farm (sampling unit) drawn from h -stratum in w -region,

$W1_{whi}$ – the weight assigned to i -farm drawn from h -stratum of w -region, whereas this weight is calculated according to this formula:

$$(2) W1_{whi} = \frac{N_{wh}}{n_{wh}},$$

N_{wh} – the number of sampling units in h -stratum of w -region,

n_{wh} – the number of sampling units drawn for the sample from h -stratum of w -region.

The $W1_{whi}$ weight might be used to estimate the survey results only if the survey is realized for all sampled units. This weight must be corrected if some of the sampled farms refuse to participate in the survey. For this purpose, the drawn sample is divided into 4 groups based on information on the survey performance:

- 1) the surveyed farms,
- 2) farms that refused to participate in the survey,
- 3) closed down farms,
- 4) farms with which the contact was not established during the survey performance.

For each stratum separately in each region, the size of the above groups, namely $n1_{wh}$, $n2_{wh}$, $n3_{wh}$, and $n4_{wh}$ is established, and then the likelihood function of surveyed and not surveyed among the farms with a determined status is established, that is:

$$(3) c_{wh} = \frac{n1_{wh} + n2_{wh}}{n_{wh} - n4_{wh}}.$$

Then the number of the n_{awh} active farms in h -stratum of w -region is calculated for the drawn sample:

$$(4) n_{awh} = n1_{wh} + n2_{wh} + c_{wh} * n4_{wh}$$

On this basis, the R_{wh} correction factor is calculated for a given stratum:

$$(5) R_{wh} = \frac{n_{awh}}{n1_{wh}}$$

The purpose of this factor is to correct the $W1_{whi}$ weight in order to obtain final W_{whi} weight:

$$(6) W_{whi} = R_{wh} * W1_{whi}$$

The sum of X variable value for Poland is the sum of values obtained for particular regions, i.e.:

$$(7) \hat{x} = \sum_w \hat{x}_w, (w = 1, 2, \dots, 17)$$

Original weights resulting from sampling are corrected not only due to incompleteness of the survey but also due to the occurrence of so called unusual farms (outliers). This pertains to farms with high assigned weight (drawn with a high likelihood function) and, at the same time, with relatively high values for some of the analyzed variables. In this case, the weight correction is to prevent significant overestimation of the value of the surveyed variable.

The weights were additionally calibrated taking into account data from the Agriculture Restructurisation and Modernisation Agency (ARMA) on the number of pigs at the regions level.

To estimate the precision of the estimation from survey of pig the formulas described in the section on sample survey of the livestock of poultry, cattle (cows) and sheep were used.

Table 3 gives the values of relative standard errors for selected surveyed variables.

Table 3. The values of the relative standard error of selected variables for Poland – based on the results of a sample survey on the livestock of poultry and animal production as well as the results of a survey of pigs – conducted in December 2025.

No. of the variable	Name of the variable	Relative standard error
1.	Milked cows	0,0
2.	Milked ewes	3,0
3.	Pigs total	0,0
4.	Sows total	1,0
5.	Chicken	0,0
6.	Laying hens	0,0