

18.12.2024 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemioplodów rolnych i ogrodniczych¹ w 2024 r.

 **2,4 %**

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem będą o ok. 2,4% mniejsze od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 35,0 mln ton

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 r. przedstawiają się następująco:

- **zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,0 mln t, tj. o ok. 2,4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;**
- produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,4 mln t, tj. o ok. 4,1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,3 mln t, tj. o ok. 12,6% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 5,9 mln t, tj. o ok. 5,9% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;
- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 18,5 mln t, tj. o ok. 9,0% więcej od zbiorów uzyskanych w 2023 roku;
- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 3,8 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego;
- ocenia się, że zbiory owoców z drzew wynoszą 3,7 mln t, tj. o 14,4% mniej od produkcji ubiegłorocznej;
- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 14,9% mniej od zbiorów w 2023 roku.

Zboża

Zbiory zbóż powszechnie prowadzono w drugiej połowie lipca. Warunki pogodowe sprzyjały na ogół prowadzeniu prac żniwnych. W pierwszej dekadzie sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych.

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2024 r. wyniosła około 7,1 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 5,7 mln ha, z tego:

- pszenicy ok. 2,4 mln ha;
- żyta ok. 0,7 mln ha;
- jęczmienia ok. 0,7 mln ha;
- owsa ponad 0,5 mln ha;
- pszenżyta ponad 1,1 mln ha;
- mieszanek zbożowych ok. 0,3 mln ha.

Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,4 mln t, tj. o ok. 4,1% mniej od uzyskanej w 2023 roku

¹ Informacja zawiera rezultaty wynikowego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych i owoców, a także III pokosu traw łąkowych opracowane na podstawie ekspertyz rzeczoznawców GUS (od szczebla gminnego) przeprowadzonych w listopadzie na podstawie lustracji pól, łąk i sadów.

Do opracowania prognozy plonów kukurydzy na ziarno, pszenicy ozimej oraz rzepaku i rzepiku ozimego wykorzystano także zdjęcia satelitarne z programu Copernicus, a także zdjęcia satelitarne MODIS.

Tabl. 1. Plony zbóż, rzepaku i rzepiku ogółem w latach 2010-2024

Wyszczególnienie	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^{a)}	2023 =100
	w decytonach z 1 ha								
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi	35,1	36,7	35,2	44,8	42,6	45,9	45,6	44,7	98,0
pszenica ozima	45,7	47,6	46,4	54,2	51,8	54,4	54,8	52,9	96,5
pszenica jara	34,3	33,5	32,6	41,7	39,6	42,4	40,4	40,8	101,0
żyto	26,9	27,8	27,2	35,1	33,1	36,0	35,5	35,7	100,6
jęczmień ozimy	40,7	41,3	43,0	51,1	47,7	49,6	50,7	46,7	92,1
jęczmień jary	33,0	33,0	32,1	40,0	37,8	39,5	37,9	38,4	101,3
owies	26,4	26,5	24,9	33,2	31,4	32,8	30,8	31,7	102,9
pszenżyto ozime	35,2	36,3	35,9	45,0	43,1	45,5	45,4	44,5	98,0
pszenżyto jare	28,4	28,4	27,5	36,4	33,7	35,6	33,1	34,4	103,9
mieszanki zbożowe ozime	30,9	30,9	30,6	38,1	36,6	37,5	37,3	37,5	100,5
mieszanki zbożowe jare	30,5	27,2	26,2	34,5	33,7	33,8	31,5	32,0	101,6
rzepak i rzepik ogółem	23,6	28,5	27,1	31,9	32,1	33,8	33,9	32,4	95,6

a) Wynikowy szacunek plonów w 2024 r.

Tabl. 2. Zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku ogółem w latach 2010-2024

Wyszczególnienie	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ^{a)}	2023 =100
	w milionach ton								
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi	25,1	24,7	25,1	28,6	27,0	26,9	26,5	25,4	95,9
pszenica ozima	8,5	9,9	9,5	12,0	11,3	12,6	12,5	11,7	93,6
pszenica jara	0,9	1,1	1,5	0,6	0,9	0,9	0,7	0,7	105,1
żyto	2,9	2,0	2,5	3,0	2,5	2,4	2,6	2,4	94,5
jęczmień ozimy	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,5	1,8	2,0	109,9
jęczmień jary	2,4	2,0	2,4	1,6	1,6	1,3	1,1	1,1	94,2
owies	1,5	1,2	1,2	1,7	1,7	1,5	1,5	1,6	107,5
pszenżyto ozime	4,2	4,7	4,1	5,9	5,2	5,3	5,2	4,9	93,6
pszenżyto jare	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	100,3
mieszanki zbożowe ozime	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	95,1
mieszanki zbożowe jare	3,0	1,9	2,3	1,7	1,9	1,0	0,7	0,7	89,2
rzepak i rzepik ogółem	2,2	2,7	2,4	3,1	3,2	3,6	3,7	3,3	87,4

a) Wynikowy szacunek zbiorów w 2024 r.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi roślinami zbożowymi) wyniosą ok. 49,4 dt/ha, tj. o 0,5 dt/ha (o 1,0%) mniej od plonów ubiegłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 44,7 dt/ha, tj. o 0,9 dt/ha (o 2,0%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 47,5 dt/ha, tj. o 1,3 dt/ha (o 2,7%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,7 dt/ha, tj. o 0,7 dt/ha (o 2,1%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi roślinami zbożowymi) ocenia się na ok. 35,0 mln t, tj. o 0,9 mln t (o 2,4%) mniej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 25,4 mln t, tj. o 1,1 mln t (o 4,1%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 21,2 mln t, tj. o 1,1 mln t (o 5,0%) mniej od zbiorów z roku ubiegłego.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 4,3 mln t, tj. o 4,7 tys. t (o 0,1%) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Kukurydza

Warunki pogodowe w bieżącym roku nie sprzyjały na ogół dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi roślin kukurydzy. Z powodu niskiej temperatury gleby w okresie wiosny, siewy kukurydzy były rozciągnięte w czasie i trwały od początku trzeciej dekady kwietnia do połowy maja. Wschody roślin były wydłużone i nierównomierne. Korzystne warunki pogodowe w czerwcu spowodowały przyspieszenie wzrostu roślin. W kolejnych miesiącach warunki wzrostu i rozwoju roślin kukurydzy były regionalnie zróżnicowane. W wielu rejonach kraju wystąpiło znaczne przesuszenie gleby powodujące słabsze wykształcenie kolb i słabsze ich zaziarnienie, a na glebach lżejszych także podsychanie roślin. W rejonach kraju, gdzie opady były bardziej regularne, warunki wegetacji kukurydzy były korzystne. Rośliny osiągnęły właściwą masę i wysokość, a kolby były dobrze wypełnione ziarnem. Plonowanie roślin jest zatem zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. W rejonach z dużym niedoborem opadów zbiór kukurydzy na zielonkę rozpoczęto w drugiej dekadzie sierpnia, a zbiór kukurydzy na ziarno w drugiej połowie września. Powszechnie zbiór kukurydzy na ziarno prowadzono w październiku. Dzięki korzystnym warunkom agrometeorologicznym w okresie zbioru, notowano niską wilgotność zbieranego ziarna kukurydzy – na poziomie 25% i niższym, co miało wpływ na redukcję kosztów dosuszania.

Ocenia się, że powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o ok. 1,7% i wyniosła blisko 1,3 mln ha. Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 73,6 dt/ha i będą większe od ubiegłorocznych o ok. 0,7 dt/ha, tj. o 1,0%. Zbiory kukurydzy na ziarno oszacowano na ok. 9,4 mln t, tj. o ok. 2,7% więcej od ubiegłorocznych.

Szacuje się, że powierzchnia kukurydzy uprawianej na zielonkę jest większa od ubiegłorocznej o ok. 5,8% i wynosi ponad 0,6 mln ha. Ocenia się, że plony kukurydzy na zielonkę w bieżącym roku wyniosą 464 dt/ha i będą niższe o ok. 0,4% od ubiegłorocznych. Zbiory kukurydzy na zielonkę ocenia się na ok. 30,0 mln t, tj. o 5,3% więcej od uzyskanych w 2023 r.

Rzepak i rzepik

Żniwa rzepaku i rzepiku rozpoczęto w pierwszej dekadzie lipca (ok. dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich latach), a powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie miesiąca. Prace żniwne przebiegały sprawnie i na początku sierpnia zostały zakończone. Nasiona rzepaku z tegorocznych zbiorów są dobrej jakości i wykazują wysoki stopień zaolejenia (ponad 40%).

Ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 8,4% i wynosi ok. 1,0 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na 3,3 mln t, tj. o ok. 12,6% mniej od ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 21,2 mln t, tj. o 5,0% mniej niż w roku ubiegłym

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 4,3 mln t, tj. o 0,1% więcej niż w roku ubiegłym

Zbiory kukurydzy na ziarno wyszacowano na 9,4 mln t, tj. o 2,7% więcej od zbiorów ubiegłorocznych

Zbiory kukurydzy na zielonkę wyszacowano na 30,0 mln t, tj. o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym

Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na 3,3 mln t, tj. o ok. 12,6% mniej od ubiegłorocznych

Ziemniaki

Na początku okresu wegetacji uwilgotnienie gleby było optymalne dla roślin ziemniaka. Późniejszy przebieg warunków pogodowych z występującym w wielu rejonach kraju niedoborem opadów deszczu, nierównomiernym ich rozkładem i wysokimi temperaturami powietrza spowodował, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie był w pełni wykorzystany. Wykopki ziemniaków rozpoczęto w sierpniu, a zakończono w drugiej dekadzie października. Jakość bulw z tegorocznych zbiorów jest przeciętna (gorsza niż w roku ubiegłym).

Ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków w 2024 r. była większa od ubiegłorocznej o ok. 4,0% i wyniosła ok. 0,2 mln ha. Plony ziemniaków w bieżącym roku oszacowano na 302 dt/ha, tj. o ok. 2,0% więcej od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków zostały oszacowane na ok. 5,9 mln t tj. o 5,9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych

Buraki cukrowe

Tegoroczny przebieg warunków pogodowych sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych, pomimo występujących rejonami niedoborów opadów deszczu. W końcowej fazie wegetacji, głównie w południowej i południowo zachodniej części kraju warunki wilgotnościowe gleby spowodowały przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale także spadek polaryzacji. Rozpoczęta w trzeciej dekadzie sierpnia kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. W większości rejonów uprawy buraków cukrowych zbior zakończono w pierwszej połowie listopada.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych jest większa od ubiegłorocznej o ok. 6,6% i wynosi blisko 0,3 mln ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 18,5 mln t tj. o ok. 9,0% więcej od uzyskanych w 2023 roku.

Siano łąkowe

W większości rejonów kraju po sprzęcie drugiego pokosu, warunki dla wzrostu roślinności łąkowej były na ogół korzystne, chociaż lokalnie obserwowano okresowe niedobory wilgoci w glebie. W południowo zachodniej części kraju ulewne deszcze we wrześniu utrudniały zbiory, a lokalnie spowodowały także podtopienia i zalania łąk. Na przeważającym obszarze kraju trzeci pokos siana łąkowego zbierano w drugiej połowie września. Plony trzeciego pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 12,1 dt/ha, tj. o ok. 3,4% więcej w porównaniu do plonów ubiegłorocznych, a zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) z trzeciego pokosu wyniosły ok. 2,8 mln t, tj. ok. 4,4% więcej w porównaniu do zbiorów z roku poprzedniego.

Warzywa gruntowe

Warunki wegetacyjne w 2024 roku były zróżnicowane, lecz na ogół niesprzyjające uprawom warzyw gruntowych. W marcu, z powodu nadmiernej wilgotności gleby doszło do opóźnień w pracach polowych, szczególnie w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Wschody warzyw wysianych pod koniec marca i na początku kwietnia były równomierne, jednak niedobór opadów deszczu, który wystąpił w drugiej połowie kwietnia, spowolnił wzrost roślin. Przymrozki na przełomie kwietnia i maja spowodowały powstanie strat mrozowych, szczególnie na plantacjach nieokrytych. W drugiej połowie maja odnotowano lokalnie występujące gradobicia, które uszkodziły część upraw, a brak opadów deszczu utrzymujący się w okresie od maja do czerwca spowodował znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. Opady deszczu w lipcu poprawiły uwilgotnienie gleby, ale jednocześnie przyczyniły się do wzrostu presji chorób grzybowych oraz szkodników roślin. Wysokie temperatury i znaczne nasłonecznienie utrzymujące się od lipca do początku września przyspieszyły dojrzewanie warzyw, jednak z powodu pogarszającego się bilansu wodnego, niezbędne było stosowanie dodatkowego nawadniania plantacji. Przebieg pogody we wrześniu i październiku sprzyjał przyrostowi masy warzyw odmian późnych, a warunki zbioru w głównych rejonach produkcji były dobre.

Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 5,9 mln t tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 5,9%

Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 18,5 mln t tj. o 9,0% więcej niż w roku ubiegłym

Zbiory z łąk trwałych III pokosu (w przeliczeniu na siano) wyniosły ok. 2,8 mln t, tj. więcej o ok. 4,4% od ubiegłorocznych

Produkcję warzyw gruntowych szacuje się na ok. 3,8 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubie-

Łączna produkcja warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) została oszacowana na ok. 3,8 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Zbiory kapusty w 2024 r. zmniejszyły się, w porównaniu z 2023 r., o 9,1% i wyniosły 571,2 tys. t. Produkcję kalafiorów oszacowano na 108,1 tys. t, tj. o 14,8% mniej niż przed rokiem, a zbiory brokułów oceniono na 77,2 tys. t, tj. o 2,3% mniej niż w 2023 r. Spadek produkcji dotyczył przede wszystkim wczesnych odmian tych warzyw. Ze względu na wzrost powierzchni uprawy, zbiory cebuli wyniosły 675,4 tys. t, czyli o 6,6% więcej niż w roku poprzednim. Produkcję marchwi oszacowano na 559,4 tys. t, tj. o 3,1% mniej niż w 2023 r., a buraków na 240,7 tys. t, czyli o 4,8% mniej niż rok wcześniej. Zbiory pomidorów gruntowych zwiększyły się o 19,9% i wyniosły 203,4 tys. t, natomiast ogórków zmniejszyły się o 14,1% do 112,7 tys. t. Produkcja pietruszki wyniosła 151,8 tys. t, czyli o 2,5% więcej niż w roku poprzednim, a selerów korzeniowych zmalała o 5,9% do 99,9 tys. t. Zbiory kukurydzy cukrowej wzrosły o 4,0% i wyniosły 160,0 tys. t. Łączna produkcja dyni, kabaczków i cukinii wyniosła 425,2 tys. t i była o 5,3% większa niż rok wcześniej. Zbiory wszystkich pozostałych gatunków warzyw gruntowych szacuje się na 446,4 tys. t.

Owoce z drzew

Z powodu przymrozków pod koniec kwietnia i na początku maja, w wielu regionach kraju odnotowano znaczne uszkodzenia mrozowe pąków kwiatowych oraz silny opad zawiązków. Do uszkodzeń owoców doszło także w drugiej połowie maja, w wyniku lokalnie występujących opadów gradu. Przebieg warunków pogodowych w kolejnych miesiącach okresu wegetacyjnego był zróżnicowany. W wielu rejonach kraju notowano deficyt opadów deszczu, skutkujący drobnieniem owoców i spadkiem jakości plonu handlowego. Wysokie temperatury powietrza w sierpniu i we wrześniu, rejestrowane również w nocy, prowadziły do gorszego wybarwienia owoców i obniżenia ich walorów smakowych. Październikowa pogoda sprzyjała prowadzonym w tym czasie zbiorom owoców.

Produkcja owoców z drzew w 2024 r. została oszacowana na 3,7 mln t, tj. o 14,4% mniej niż w roku poprzednim. Zbiory z sadów jabłoniowych wyniosły prawie 3,4 mln t i były o 13,1% niższe w porównaniu z 2023 r. Produkcję gruszek w sadach oceniono na 74,2 tys. t, tj. o 6,1% mniej niż przed rokiem, natomiast zbiory śliwek były niższe o 25,1% i wyniosły 95,2 tys. t. Produkcję wiśni oszacowano na 110,2 tys. t, tj. o 34,6% mniej niż rok wcześniej, zaś zbiory czereśni spadły o 25,8% do 51,0 tys. t. Łączną produkcję brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich oceniono na 14,1 tys. t, tj. o 27,9% mniej niż przed rokiem. Zbiory pozostałych owoców z drzew zmniejszyły się o 17,7% do 2,3 tys. t.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na 481,7 tys. t, tj. o 14,9% mniej niż w roku poprzednim. Do spadku zbiorów przyczyniły się przymrozki na przełomie kwietnia i maja, które spowodowały uszkodzenia kwiatów i zawiązanych owoców. Brak dostatecznej ilości opadów deszczu w trakcie wegetacji spowodował znaczne skrócenie okresu plonowania większości gatunków owoców jagodowych. Zbiory malin w 2024 r. zmniejszyły się o 20,0% względem poprzedniego roku i wyniosły 76,9 tys. t. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na 100,2 tys. t, tj. o 22,7% mniej niż w 2023 r., z czego zbiory porzeczek czarnych oceniono na 67,9 tys. t, tj. o 25,8% mniej niż przed rokiem. Produkcja borówki wysokiej utrzymała się na poziomie z 2023 r. i wyniosła 62,0 tys. t, a zbiory truskawek zmniejszyły się o 11,8% i wyniosły 158,6 tys. t. Produkcja aronii została oceniona na 45,1 tys. t, tj. o 15,8% mniej niż w 2023 r., a agrestu spadła do 6,5 tys. t i była o 21,5% mniejsza niż rok wcześniej. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oszacowano na 32,4 tys. t, tj. o 11,3% mniej niż w 2023 r.

Zbiory owoców z drzew w sadach są szacowane na 3,7 mln t, tj. o 14,4% mniej od produkcji z roku poprzedniego

Zbiory owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych oceniono na blisko 0,5 mln t, tj. o 14,9% mniej niż w roku poprzednim

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2024 roku

We wrześniu notowano wyjątkowo wysokie temperatury powietrza, znacznie przekraczające normy wieloletnie. W pierwszej połowie września rejonami uwilgotnienie gleby było niedostateczne z uwagi na niedobór opadów. Występujące w drugiej dekadzie miesiąca, głównie w południowo zachodniej części kraju ulewne deszcze spowodowały podtopienia pól i powodzi. W wyniku powodzi i podtopień wiele gospodarstw odnotowało straty w uprawach i na trwałych użytkach zielonych. Na terenach niezalanych ciepła i słoneczna pogoda stwarzała na ogół dobre warunki dla przeprowadzania zbioru upraw. W pierwszej dekadzie września zakończono rozpoczęte w sierpniu siewy rzepaku ozimego oraz rozpoczęto siewy żyta i pszenżyta. Do siewu pszenicy ozimej przystąpiono w drugiej połowie września. W ciągu miesiąca kontynuowano rozpoczęte w sierpniu wykopki ziemniaków, prowadzono zbiór buraków cukrowych, a także zbiór kolejnego pokosu traw łąkowych i wieloletnich roślin motylkowych. W całym kraju w drugiej połowie września rozpoczęto zbiór kukurydzy na ziarno. Lokalnie pod koniec miesiąca zbierano poplony ścierniskowe.

Tabl. 3. Temperatura powietrza i opady w okresie od wiosny 2024 do jesieni 2024 r.

Wyszczególnienie	Średnia krajowa temperatura powietrza		Średnie krajowe sumy opadów	
	°C	odchylenie od normy ^{a)}	mm	% normy ^{a)}
WIOSNA ^{b)} 2024				
Marzec	6,7	3,6	28,4	75,1
Kwiecień	10,5	1,9	37,8	104,0
Maj	16,0	2,6	33,9	53,3
LATO ^{b)} 2024				
Czerwiec	18,4	1,6	74,9	109,0
Lipiec	20,3	1,5	92,2	105,0
Sierpień	20,2	1,7	64,3	97,0
JESIEŃ ^{b)} 2024				
Wrzesień	16,9	3,2	67,9	118,0
Październik	10,1	1,3	33,2	71,0
Listopad	3,8	-0,2	31,8	80,1

a) Jako normę IMiGW przyjmuje od 2021 r. średnie z lat 1991-2020.

b) Średnie miesięczne / obliczenia GUS na podstawie danych IMiGW/.

Ciepła i słoneczna pogoda w październiku z okresowymi intensywnymi opadami deszczu stwarzała dobre warunki dla wykonywania prac polowych. Do końca drugiej dekady października zakończono rozpoczęte we wrześniu siewy żyta i pszenżyta oraz pszenicy ozimej. Oziminy wysiane we wrześniu zaczęły się krzewić pod koniec października. Tak samo jak przed rokiem, stan wschodów upraw ozimych oceniono na 3,8 do 3,9 stopnia kwalifikacyjnego. W drugiej połowie miesiąca zakończono wykopki ziemniaków. Prowadzono nadal zbiór buraków cukrowych oraz kukurydzy uprawianej na ziarno. W ciągu miesiąca zbierano poplony ścierniskowe. Powszechnie wykonywano orki przedzimowe. Do końca miesiąca na obszarze całego kraju trwał okres pastwiskowy.

Temperatura powietrza w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Umożliwiała także wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane

w optymalnych terminach agrotechnicznych krzewiły się, a dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin. W połowie miesiąca dobiegał końca zbiór buraków cukrowych. Kończono także zbiór poplonów ścierniskowych oraz wykonywanie orok przedzimowych i innych jesiennych prac polowych. Sprzyjające warunki termiczne w wielu rejonach kraju wpłynęły na przedłużenie sezonu pastwiskowego do końca listopada.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2025 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. na poziomie nieco wyższym niż w roku ubiegłym, z tego:

- ✓ pszenicy ozimej zasiano ok. 2,2 mln ha,
- ✓ żyta ok. 0,7 mln ha,
- ✓ pszenżyta ozimego ponad 1,2 mln ha,
- ✓ jęczmienia ozimego ponad 0,4 mln ha,
- ✓ mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na około 1,0 mln ha.

Zasiewy zbóż ozimych pod zbiory w 2025 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono w stopniach kwalifikacyjnych następująco:

- ✓ mieszanki zbożowe ozime na 3,9 stopnia,
- ✓ pszenica ozima na 4,0 stopnia,
- ✓ pszenżyto ozime na 4,0 stopnia,
- ✓ jęczmień ozimy na 4,0 stopnia,
- ✓ żyto na 4,1 stopnia.

Stan zasiewów pszenicy, pszenżyta i jęczmienia oceniono na poziomie roku ubiegłego, natomiast zasiewy mieszanek zbożowych i żyta oceniono na poziomie nieco wyższym od oceny ubiegłorocznej.

W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się:

- ✓ dla pszenicy od 3,1 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 4,7 stopnia w województwie opolskim,
- ✓ dla żyta od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 5,0 stopnia w województwie pomorskim,
- ✓ dla jęczmienia od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 4,5 stopnia w województwach: opolskim i wielkopolskim,
- ✓ dla pszenżyta od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 5,0 stopnia w województwie pomorskim,
- ✓ dla mieszanek zbożowych od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 4,7 stopnia w województwie opolskim.

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 4,0 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji rzepaku i rzepiku wahały się od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 4,5 stopnia w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano blisko 86% powierzchni pszenicy ozimej, ponad 94% powierzchni żyta, 91% powierzchni jęczmienia ozimego, ponad 88% powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 88% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 93% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.

Wynikowe dane o powierzchni, plonach i zbiorach głównych upraw rolnych i ogrodnich (według województw) zamieszczane będą na stronie internetowej GUS w publikacji: „Produkcja upraw rolnych i ogrodnich w 2024 roku”. Termin wydania publikacji – 30 kwietnia 2025 roku.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Opracowanie merytoryczne:
Departament Rolnictwa i Środowiska

Dyrektor Marta Wojciechowska
Tel.: 22 608 31 28

Rozpowszechnianie:
Wydział Współpracy z Mediami

Tel. komórkowy: +48 695 255 032
Tel. stacjonarne: +48 22 608 38 04, +48 22 449 41 45,
+48 22 608 30 09

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl



www.stat.gov.pl



[@GUS_STAT](https://twitter.com/GUS_STAT)



[@GlownyUrzadStatystyczny](https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny)



[gus_stat](https://www.instagram.com/gus_stat)



[glownyurządstatystycznygus](https://www.youtube.com/glownyurządstatystycznygus)



[glownyurządstatystyczny](https://www.linkedin.com/company/glownyurządstatystyczny)

Powiązane opracowania

[Produkcja upraw rolnych i ogrodnich w 2023 roku](#)

Temat dostępny w bazach danych

[BDL: Powierzchnia zasiewów](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[BDL: Uprawa roślin](#)